

# QUY TRÌNH XỬ TRÍ TỔN THƯƠNG DO KIM TIÊM HAY VẬT SẮC NHỌN ĐÂM

( Ban hành kèm theo Quyết định số QĐ-YTKS ngày tháng 01 năm 2022 )

## I. MỤC ĐÍCH

- Nhân viên y tế nắm được cách sơ cứu an toàn khi bị tổn thương do kim hay vật sắc nhọn đâm.
- Đơn vị biết được và xử trí đúng, kịp thời cho nhân viên y tế bị tổn thương.

## II. THỰC HIỆN QUY TRÌNH

STT	NỘI DUNG
1	Sơ cứu ngay sau khi bị tổn thương: <ul style="list-style-type: none"><li>- Rửa ngay tổn thương bằng xà phòng và nước dưới vòi nước chảy</li><li>- Để máu vết thương tự chảy, không nặn bóp vết thương</li><li>- Băng vết thương lại</li></ul>
2	Báo cáo người phụ trách và làm biên bản điền đầy đủ thông tin theo mẫu báo cáo sự cố y khoa gửi Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ (Ngoài giờ hành chính: báo cáo trưởng tua trực).
3	Đánh giá nguy cơ phơi nhiễm: <ul style="list-style-type: none"><li>- Có nguy cơ khi: tổn thương do kim dính máu đâm xuyên qua da, do dao mổ hoặc ống nghiệm chứa máu và chất dịch cơ thể của người bệnh bị vỡ đâm vào, máu và chất dịch cơ thể của người bệnh bắn vào các vùng da, niêm mạc bị tổn thương viêm loét hoặc xây sát từ trước</li><li>- Không có nguy cơ khi: Máu và dịch cơ thể của người bệnh bắn vào vùng da lành</li></ul>
4	Xác định tình trạng HIV của nguồn gây phơi nhiễm: <ul style="list-style-type: none"><li>- Đánh giá nguy cơ dựa vào triệu chứng lâm sàng của người bệnh nguồn.</li><li>- Người bệnh đã được xác định HIV (+): Tìm hiểu các thông tin về tiền sử và đáp ứng đối với thuốc ARV.</li><li>- Nếu chưa biết về tình trạng HIV của nguồn gây phơi nhiễm: Tư vấn và lấy máu xét nghiệm HIV.</li><li>- Trường hợp không thể xác định được (bị phơi nhiễm trong trường hợp đang làm nhiệm vụ, đối tượng trốn thoát)</li></ul>

STT	NỘI DUNG
5	<p>Xác định tình trạng HIV của người bị phơi nhiễm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tư vấn trước và sau khi xét nghiệm HIV theo quy định.</li> <li>- Nếu ngay sau khi phơi nhiễm, người bị phơi nhiễm có HIV (+) là đã bị nhiễm HIV từ trước không phải do phơi nhiễm.</li> <li>- Nếu HIV (-) : Kiểm tra lại sau 3 và 6 tháng.</li> <li>- Xét nghiệm công thức máu và chức năng gan (ALT) khi bắt đầu điều trị và sau 2- 4 tuần.</li> <li>- Xét nghiệm HIV sau 3 và 6 tháng.</li> <li>- Hỗ trợ tâm lý nếu cần thiết.</li> </ul>
6	<p>Tư vấn và điều trị sau phơi nhiễm: Người được xác định là phơi nhiễm với máu, dịch cơ thể và vật sắc nhọn từ nguồn có chứa HIV, HBV, HCV cần tới gặp bác sĩ Khoa Truyền nhiễm- Kiểm soát nhiễm khuẩn để được tư vấn, và điều trị dự phòng.</p>

